

Avföringsprov - F-Kalprotektin





INFORMATION

Utredning om eventuell inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i form av ulcerös kolit och Crohns sjukdom samt uppföljning av sjukdomsförlopp och behandlingseffekt vid dessa sjukdomar.

FÖRBEREDELSE




Se till att du har allt provtagningsmaterial tillgängligt och planera om möjligt så att du kan lämna in ditt prov samma dag.

PROVTAGNINGSMATERIAL

<p>Provtagningsrör med sked i brunt skruvlock.</p>	
<p>Ytterhylsa (transporthylsa)</p> <ul style="list-style-type: none"> Placera provtagningsröret i transporthylsa eller i ren plastpåse efter provtagning 	
<p>Remiss och Etikett</p> <ul style="list-style-type: none"> På remissen ska ditt namn, personnummer och önskad analys var ifyllda. Etikett med ditt personnummer och namn. Om du inte fått en etikett ska du skriva ditt personnummer, namn och datum för provtagning direkt på provtagningsröret. 	
<p>Om du skickar provet med post använd vadderat kuvert som är adresserat och frankerat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Transporthylsan med provtagningsröret läggs i det vadderade kuvertet. Skickas per post eller lämnas till din vårdgivare snarast. 	

Avföringsprov - F-Kalprotektin

GÖR SÅ HÄR

1. Försök om möjligt ta provet samma dag som det lämnas till mottagning/laboratorium.	
2. Lägg rikligt med toalettpapper i ren toalettstol innan du tömmer tarmen. Alternativt använd ett rent engångskärl.	
<p>3. Skruva av locket på provtagningsröret och använd den sked som sitter fast i locket. För över 3-4 skedar fast avföring eller 1-2 mL lös avföring till provtagningsröret. Sätt tillbaka locket med skeden i röret och skruva på locket ordentligt. Avföring kan även tas från blöja.</p> <p>Observera! Ingen avföring får finnas på utsidan på provröret.</p>	
4. Se till att provtagningsröret är märkt med namn, personnummer samt tid och datum när du tagit provet. Saknar du etikett, skriv direkt på röret.	
<p>5. Stoppa röret i transporthylsan och skruva på locket ordentligt.</p> <p>Observera! Ingen avföring får finnas på ytterhylsan (transporthylsa).</p>	
6. Lämna provet snarast, helst samma dag, till din mottagning eller laboratorium.	
I väntan på att du ska lämna in provet kan det förvaras i rumstemperatur eller i kylskåp.	
7. Om provet ska skickas med post: Lägg provet och remissen i transportkuvertet och lämna i brevlåda eller på postkontor. Undvik fredagar och dag före helgdag eftersom ingen utdelning av post sker lördagar, söndagar eller helgdagar.	
8. Om du ska ta flera prov så upprepa provtagningen och ta ett nytt provtagningsrör vid tarmtömning. Upprepade provtagningar bör tas vid olika tillfällen.	