

## Avföringsprov - Tarmparasiter





### INFORMATION

Utredning av mag- tarmbesvär, diarréer, mm.  
Hälsokontroll efter vistelse i endemiskt område.

### FÖRBEREDELSE




Se till att du har allt provtagningsmaterial tillgängligt och planera om möjligt så att du kan lämna in ditt prov samma dag.

### PROVTAGNINGSMATERIAL

<p>Provtagningsrör med SAF-lösning. Obs. töm inte ur lösningen från röret.</p>	
<p>Etikett och Remiss</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etikett med ditt personnummer och namn sätts på provtagningsröret.</li> <li>• Om du inte fått en etikett ska du skriva ditt personnummer, namn och datum för provtagning direkt på provtagningsröret.</li> <li>• På remissen ska ditt namn, personnummer och önskad analys var ifyllda.</li> </ul>	
<p>Transporthylsa (=ytterhylsa)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placera provtagningsröret i transporthylsan eller i ren plastpåse <b>efter</b> provtagning.</li> </ul>	
<p>Om du skickar provet med post använd vadderat kuvert som är adresserat och frankerat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transporthylsan med provtagningsröret läggs i det vadderade kuvertet.</li> <li>• Skickas per post eller lämnas till din vårdgivare snarast.</li> </ul>	

## Avföringsprov - Tarmparasiter

### GÖR SÅ HÄR

<p>1. Försök om möjligt ta provet samma dag som det lämnas till mottagning/laboratorium.</p>	
<p>2. Lägg rikligt med toalettpapper i ren toalettstol innan du tömmer tarmen. Alternativt använd ett rent engångskärl.</p>	
<p>3. Skruva av locket på provtagningsröret och använd den sked som sitter fast i locket. För över 3-4 skedar fast avföring eller 1-2 mL lös avföring till provtagningsröret. Skruva på locket (med skeden) ordentligt så att inget läcker ut från röret. Avföring kan även tas från avföring i blöja.</p> <p><b>Observera!</b> Ingen avföring får finnas utanpå provtagningsröret.</p>	
<p>4. Se till att provtagningsröret är märkt med <b>namn</b>, <b>personnummer</b> samt <b>tid och datum</b> när du tagit provet. Saknar du etikett skriv direkt på röret.</p>	
<p>5. Stoppa provtagningsröret i transporthylsan (=ytterhylsa) och skruva på locket ordentligt.</p> <p><b>Observera!</b> Ingen avföring får finnas på transporthylsan.</p>	
<p>6. Lämna provet snarast, helst samma dag, till din mottagning eller laboratorium. Förvara provet kallt (+2°C till +8 °C) innan du lämnar in det.</p>	
<p>7. Om provet ska skickas med post: Lägg transporthylsan, med provtagningsröret i, och remissen i transportkuvertet. Lämna i brevlåda eller på postkontor. Undvik fredagar och dag före helgdag eftersom ingen utdelning av post sker nästföljande dag.</p>	
<p>8. Om du ska ta flera prov så upprepa provtagningen och ta ett nytt provtagningsrör vid varje tarmtömning. Upprepade provtagningar bör tas vid olika dagar.</p>	