

Typ 2-diabetes – behandlingsalgoritm

Rökstopp och levnadsvanor

Metformin

Uttalad fetma (BMI ≥ 35 kg/m ²)	Manifest kardio- vaskulär sjukdom	Hjärtsvikt	Nedsatt njurfunktion (eGFR < 30 ml/min)*	Mest sjuka äldre	Övriga t ex normal- viktig utan komplex samsjuklighet
<p>Liraglutid (Victoza) Lixisenatid (Lyxumia)</p> <p>HbA1c-sänkning 10-15 mmol/mol</p> <p>Viktnedgång 3-4 kg</p> <p>Låg hypoglykemirisk</p> <p>Gastrointestinala bieffekter</p> <p>Empagliflozin (Jardiance) Kanagliflozin (Invokana)</p> <p>HbA1c-sänkning ca 10 mmol/mol</p> <p>Viktnedgång 2-3 kg</p> <p>Låg hypoglykemirisk</p> <p>Risk för urogenital infektion, ketoacidosis</p> <p>Kanagliflozin – risk för amputation, benfraktur</p> <p>Liraglutid (Victoza)</p> <p>HbA1c-sänkning 10-15 mmol/mol</p> <p>Viktnedgång 3-4 kg</p> <p>Låg hypoglykemirisk</p> <p>Gastrointestinala bieffekter</p>	<p>Empagliflozin (Jardiance) Kanagliflozin (Invokana)</p> <p>HbA1c-sänkning ca 10 mmol/mol</p> <p>Viktnedgång 2-3 kg</p> <p>Låg hypoglykemirisk</p> <p>Risk för urogenital infektion, ketoacidosis</p> <p>Kanagliflozin – risk för amputation, benfraktur</p> <p>Liraglutid (Victoza)</p> <p>HbA1c-sänkning 10-15 mmol/mol</p> <p>Viktnedgång 3-4 kg</p> <p>Låg hypoglykemirisk</p> <p>Gastrointestinala bieffekter</p>	<p>Empagliflozin (Jardiance) Kanagliflozin (Invokana)</p> <p>HbA1c-sänkning ca 10 mmol/mol</p> <p>Viktnedgång 2-3 kg</p> <p>Låg hypoglykemirisk</p> <p>Risk för urogenital infektion, ketoacidosis</p> <p>Kanagliflozin – risk för amputation, benfraktur</p>	<p>Sitagliptin (Januvia) Linagliptin (Trajenta)</p> <p>HbA1c-sänkning 6-8 mmol/mol</p> <p>Viktneutralt</p> <p>Låg hypoglykemirisk</p> <p>Repaglinid (Repaglinid)</p> <p>lakttag försiktighet, starta med låg dos (0,5 mg) till måltiderna (1-3 ggr/dag) och vid behov trappa upp dosen försiktigt.</p> <p>Risk för hypoglykemi och viktuppgång.</p> <p>Insulin human (Insuman Basal)</p> <p>Risk för hypoglykemi och viktuppgång</p>	<p>Sitagliptin (Januvia) Linagliptin (Trajenta)</p> <p>HbA1c-sänkning 6-8 mmol/mol</p> <p>Viktneutralt</p> <p>Låg hypoglykemirisk</p> <p>Insulin human (Insuman Basal)</p> <p>Risk för hypoglykemi och viktuppgång</p>	<p>Glimepirid (Glimepirid) Glipizid (Mindiab) Repaglinid (Repaglinid) Insulin human (Insuman Basal) Liraglutid (Victoza) Lixisenatid (Lyxumia) Empagliflozin (Jardiance) Kanagliflozin (Invokana) Sitagliptin (Januvia) Linagliptin (Trajenta) Pioglitazon (Pioglitazone) Akarbos (Glucobay)</p>

* Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation 4:2017, tabell VII.

** Alla snabbverkande insuliner är likvärdiga och av kostnadsskäl väljs det billigaste alternativet vid nyinsättning och receptförnyelse.

Insulin

Basinsulin
Snabbverkande insulin

(Insuman Basal)
(Insulin Lispro Sanofi)**