

## Rökstopp och levnadsvanor

### Metformin

Uttalad fetma (BMI ≥ 35 kg/m <sup>2</sup> )	Manifest kardiovaskulär sjukdom	Hjärtsvikt	Övriga t ex normal-viktig utan komplex samsjuklighet	Mest sjuka äldre	Nedsatt njurfunktion (eGFR < 30 ml/min)*
<p><i>GLP-1-analog</i>                      Liraglutid (Victoza)                      Semaglutid (Ozempic)                      Dulaglutid (Trulicity)                      HbA1c-sänkning                      10-15 mmol/mol                      Viktnedgång 3-4 kg                      Låg hypoglykemisk                      Gastrointestinala bieffekter</p> <p><i>SGLT-2-hämmare</i>                      Dapagliflozin (Forxiga)                      Empagliflozin (Jardiance)                      Kanagliflozin (Invokana)                      HbA1c-sänkning                      ca 10 mmol/mol                      Viktnedgång 2-3 kg                      Låg hypoglykemisk                      Risk för urogenital infektion, ketoacidosis</p>	<p><i>GLP-1-analog</i>                      Liraglutid (Victoza)                      Semaglutid (Ozempic)                      Dulaglutid (Trulicity)                      HbA1c-sänkning                      10-15 mmol/mol                      Viktnedgång 3-4 kg                      Låg hypoglykemisk                      Gastrointestinala bieffekter</p> <p><i>SGLT-2-hämmare</i>                      Dapagliflozin (Forxiga)                      Empagliflozin (Jardiance)                      Kanagliflozin (Invokana)                      HbA1c-sänkning                      ca 10 mmol/mol                      Viktnedgång 2-3 kg                      Låg hypoglykemisk                      Risk för urogenital infektion, ketoacidosis</p>	<p><i>SGLT-2-hämmare</i>                      Dapagliflozin (Forxiga)                      Empagliflozin (Jardiance)                      Kanagliflozin (Invokana)                      HbA1c-sänkning                      ca 10 mmol/mol                      Viktnedgång 2-3 kg                      Låg hypoglykemisk                      Risk för urogenital infektion, ketoacidosis</p>	<p>Glimepirid (Glimepirid)                      Glipizid (Mindiab)                      Repaglinid (Repaglinid)                      Insulin human (Insuman Basal)                      Liraglutid (Victoza)                      Dulaglutid (Trulicity)                      Semaglutid (Ozempic)                      Dapagliflozin (Forxiga)                      Empagliflozin (Jardiance)                      Kanagliflozin (Invokana)                      Sitagliptin (Januvia)                      Linagliptin (Trajenta)                      Pioglitazon (Pioglitazone)                      Akarbos (Glucobay)</p>	<p><i>DPP-4-hämmare</i>                      Linagliptin (Trajenta)                      Sitagliptin (Januvia)                      HbA1c-sänkning                      6-8 mmol/mol                      Viktneutralt                      Låg hypoglykemisk                      Insulin human (Insuman Basal)                      Risk för hypoglykemi och viktuppgång</p>	<p><i>DPP-4-hämmare</i>                      Linagliptin (Trajenta)                      Sitagliptin (Januvia)**                      HbA1c-sänkning 6-8 mmol/mol                      Viktneutralt                      Låg hypoglykemisk                      Repaglinid (Repaglinid)                      Iakttag försiktighet, starta med låg dos (0,5 mg) till måltiderna (1-3 ggr/dag) och vid behov trappa upp dosen försiktigt.                      Risk för hypoglykemi och viktuppgång.                      Insulin human (Insuman Basal)                      Risk för hypoglykemi och viktuppgång</p>

\* Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation 4:2017, tabell VII.

\*\* Reducerad dos.

\*\*\* Alla snabbverkande insuliner är likvärdiga och av kostnadskäl väljs det billigaste alternativet vid nyinsättning och receptförnyelse.

### Insulin

Basinsulin  
 Snabbverkande insulin

(Insuman Basal)  
 (Insulin Lispro Sanofi)\*\*