

UROLOGI

NSAID

Då tillgången på alternativa beredningsformer av NSAID är begränsad, rekommenderar vi diklofenak som stolpiller och injektion, men endast vid indikationen akut uretärstenssmärta. Diklofenak är annars ett läkemedel som vi bör undvika så långt möjligt, på grund av medicinska bieffekter i form av risk för hjärtkärlbiverkningar, samt negativa miljöeffekter. Med de enstaka doser som är aktuella vid akut uretärstenssmärta finner vi det ändå motiverat att rekommendera diklofenak utifrån att alternativ saknas.

Överaktiv blåsa

Under 2019 har generika för Vesicare (solifenacin) introducerats, solifenacin tas med bland våra rekommendationer tillsammans med tolterodin.

Effekten är ofta blygsam för denna typ av preparat, men kan hos vissa patienter fungera bra. Viktigt med uppföljning av effekten.

Prismässigt är för närvarande solifenacin det billigare alternativet, knappt en krona per tablett, tolterodin i depotform kostar 2-3 kronor per tablett.

Mirabegron (Betmiga) finns inte på basläkemedelslistan. Preparatet är betydligt dyrare (>10 kr/tab) men används alltmer. Även här är effekten ofta blygsam, men en annan verkningsmekanism gör att patienten slipper antikolinerga biverkningar. Försiktighet vid samtidig hjärt-kärlsjukdom och kontroll av blodtrycket är viktigt.

Expertgrupp urologi

Farhood Alamdari

farhood.alamdari@regionvastmanland.se