

Informationstillfälle - vaccinationer hösten 2025



Agenda

- Vaccinationsstart och rekommenderade grupper
- Beställning vaccin
- Behörighet Bot
- Behörighet ordination
- Instruktionsfilm Bot
- Kombinera vaccin
- Övrigt

Samvaccination covid-19 och influensa

- Höstens vaccinationsinsats för samvaccination av covid-19 och influensa startar den 14 oktober.
 - Rekommenderade grupper för samvaccination är personer i åldern 75+, medicinska riskgrupper från 50 år samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser i hemmet, till exempel via hemtjänst eller på SÄBO
 - Personer som haft en bekräftad covid-19 efter 1 september 2025 kan tryggt avstå höstens dos, förutsatt att de inte har någon nedsättning av immunförsvaret. Det gäller alla grupper och oavsett tidigare vaccination.

Personer 50-74 år med någon av följande underliggande sjukdomar eller tillstånd rekommenderas samvaccination

- hjärt-kärlsjukdom inklusive stroke (högt blodtryck som enda diagnos ingår inte)
- kronisk lungsjukdom såsom KOL eller svår, instabil astma
- diabetes mellitus typ 1 och 2
- leversvikt
- njursvikt
- nedsatt immunförsvar på grund av läkemedelsbehandling eller immunhämmande sjukdom eller tillstånd, till exempel blodcancersjukdomar och Downs syndrom
- sjukdomar eller tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation, till exempel neuromuskulär sjukdom, flerfunktionsnedsättning eller obesitas med ett BMI på 40 eller högre.

Övriga grupper

- Personer 18–49 år med nedsatt immunförsvar på grund av läkemedelsbehandling eller immunhämmande sjukdom eller tillstånd, till exempel blodcancersjukdomar, njursvikt och Downs syndrom (graviditet omfattas inte).
- Personer som inte omfattas av rekommendationerna enligt definitionerna ovan, men som har en svår grundsjukdom eller ett tillstånd som gör att covid-19 riskerar att få ett allvarligt förlopp, rekommenderas vaccination oavsett ålder. Exempel på sådan sjukdom kan vara svår lungsjukdom eller uttalad skörhet på grund av omfattande samsjuklighet eller flerfunktionsnedsättning. Läkarbedömning kan behövas för att identifiera dessa personer.
- Har en läkare bedömt att man skall vaccinera sig pga skörhet eller underliggande sjukdom ingår man i riskgrupp. Ingen ordination behövs.
- Icke rekommenderade grupper kan inte få covid vaccin

Grupper som enbart rekommenderas vaccin mot influensa

Personer som rekommenderas enbart influensavaccin rekommenderas att vänta till 4:e november

- Friska personer mellan 65 år-74 år
- Hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal
- Riskgrupper mellan 6 månaders ålder - 49 år
- Hushållskontakter, både barn och vuxna, till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
- Personer som rekommenderas samvaccinera sig men som inte önskar vaccinera sig mot covid-19

Barn och vuxna med följande sjukdomar, diagnoser eller tillstånd som rekommenderas enbart influensavaccin

Personer 6 månader - 49 år med följande riskfaktor:

- Hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke (hypertoni som enda diagnos ingår ej)
- Kronisk lungsjukdom såsom KOL eller svår instabil astma
- Diabetes mellitus typ 1 och 2
- Leversvikt
- Njursvikt
- Sjukdomar eller tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation, till exempel obesitas med ett BMI på 40 eller högre, neuromuskulära sjukdomar eller en funktionsnedsättning.
- Graviditet (efter graviditetsvecka 12). För de gravida som har en ytterligare riskfaktor kan vaccination ske även före graviditetsvecka 13.
- Annan sjukdom eller tillstånd med nedsatt allmäntillstånd, där en influensasjukdom riskerar ett allvarligt vårdförlopp. Exempel på sådana sjukdomar eller tillstånd kan vara demens, psykisk sjukdom eller skadligt alkohol- eller drogbruk, som orsakat en nedsatt kroppslig hälsa.

Personer under 18 år

- nedsatt immunförsvar på grund av läkemedelsbehandling eller immunhämmande sjukdom eller tillstånd, till exempel blodcancersjukdomar och Downs syndrom

Vaccin mot covid-19 och influensa

Rekommendationer hösten 2025

Vaccination
influensa

Vaccination
covid-19 & influensa

75 år och äldre utan annan risk



65-74 år utan annan risk



50 år och äldre med ökad risk



18 år och äldre med
nedsatt immunförsvar



6 månader till 49 år med ökad risk



Gravid efter vecka 12



Närstående till någon med
kraftigt nedsatt immunförsvar



Vaccination av personal

- Rekommendation till personal för vaccination mot influensa
 - Personal som arbetar nära patienter och omsorgstagare i riskgrupp rekommenderas att vaccinera sig för att minska risken för vårdrelaterad smitta av influensa. Vaccination är särskilt viktigt för personal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
- Rekommendation till personal för vaccination mot covid-19
 - Det finns ingen rekommendation för vaccination mot covid-19 av vårdpersonal.

Vaccin Covid-19

- Nytt uppdaterat vaccin för covid-19 (Comirnaty) kommer finnas tillgängligt för vaccinationsstart den 14 oktober
- Vårdcentraler- Beställ vaccin senast 1 oktober, före kl 14.00 för leverans inför vaccinationsstart Beställningsformulär primärvård.
- Sjukhusen i Västerås, Köping, Fagersta och Sala - Beställning görs via mail till vaccinkoordinator@regionvastmanland.se
- Hemsjukvård och SÄBO hämtar vaccin på vårdcentral.
 - För hemsjukvård i Västerås är det möjligt att hämta covid-vaccin på sjukvårdsfarmaci. Beställning och ö.k om upphämtning görs via mail till vaccinkoordinator@regionvastmanland.se

Vaccin influenza

- Fluarix - Influen savaccin standarddos. Varunummer 149960 (10x1) Förfylld spruta utan nål med Luer Lock- koppling.
- Fluad - Förstärkt tetravalent influensavaccin. Ges endast till personer som är 50 år och äldre boende på särskilda boenden (SÄBO) eller på LSS-boende samt till personer med hemsjukvård. Varunummer 193448 (10x1) utan nål, Luer Lock - koppling
- Vaccin beställs via Oriola för vårdcentraler och specialistvården
 - För SÄBO och hemsjukvård görs beställning till Vårdcentral och vaccinet hämtas där.
 - OBS - hemsjukvården för Västerås stad beställer sitt influensavaccin själv.

Vaccinationsbot för registrering av vaccination

- Alla vaccinationer för covid-19 och influensa ska registreras med bot i cosmic.
- Covid-19 och influensa registreras med två olika botar.
 - Finns i Cosmic i uthopp
 - Vaccinationsbot Covid-19
 - Vaccinationsbot influensa och pneumokockvaccination
- För att kunna använda boten behöver den vara installerad på den dator ni använder vid vaccination. Installation görs genom att kontakta IT-supporten 021-173500

Behörigheter

- Vaccinatör behöver behörighet i Cosmic för att kunna registrera med boten
 - Behörigheten beställs av er HSA-redaktör och heter
 - Sjuksköterska – Vaccination säsongsinfluensa
 - Sjuksköterska – Vaccination covid-19
- Det är inte möjligt att registrera vaccinationer inloggad på en slutenvårdsavdelning. Vaccinatörer inom slutenvården behöver därför behörighet till den mottagning som boten är kopplat till: [Centuri \(regionvastmanland.se\)](https://regionvastmanland.se).
 - Hör av er till oss om er klinik saknas eller om ni är osäkra på vilken enhet ni ska logga in på.

Behörighet att ordinera vaccin

- Barn- och distriktsjuksköterskor har behörighet att ordinera vaccin mot covid-19, influensa och pneumokock.
- Behörighetsutbildning finns för vaccination mot covid-19, influensa och pneumokock finns på kompetensplatsen för sjuksköterskor som saknar behörighet.
- Verksamhetschef kan efter avslutad utbildning bedöma om personen anses vara behörig att ordinera vaccination. Blankett ska då fyllas i – [Behörighet för sjuksköterska att ordinera vaccin](#)

När behörighet att ordinera vaccin saknas

- Om vaccinator saknar behörighet behöver läkare på enheten ordinera vaccination.
- Ordinationen ska göras i patientens journal, ej i läkemedelsmodulen.
- Det finns mallar i Cosmic som läkare kan använda vid ordination av vaccination.
[sokordsmall-for-ordination-av-vaccin-for-covid-och-influensa-1-1.pdf](https://regionvastmanland.se/sokordsmall-for-ordination-av-vaccin-for-covid-och-influensa-1-1.pdf)
(regionvastmanland.se)

Film Bot

- Film Bot influenza

Kombination av flera vaccin

- Huvudregeln är att alla typer av inaktiverade vacciner kan ges i kombination med andra inaktiverade och levande försvagade vacciner samtidigt
- Samtidig administration av flera vaccin kan ge ökade främst lokala biverkningar, men även risk för ökad feberreaktion. De individuella konsekvenserna av ev. ökade biverkningar för den vaccinerade behöver beaktas när två eller fler vaccin ges samtidigt. Det är särskilt viktigt vid vaccination av äldre, medicinskt sköra personer och vid vaccination av gravida.
- [kombination-av-vaccin-vid-samvaccinering--25.pdf](#)

Övrigt

- Vårdgivarwebben: [Vaccinationer - Region Västmanland \(regionvastmanland.se\)](https://regionvastmanland.se/vaccinationer)
- Kontaktuppgifter till samordningsfunktionen för vaccinationer och egenprovtagning
vaccinationsplanering@regionvastmanland.se