

Samvaccination – kombinera olika vaccin

Huvudregeln är att alla typer av inaktiverade vacciner kan ges i kombination med andra inaktiverade och levande försvagade vacciner samtidigt. Detta gäller även per orala levande försvagade vacciner. Det finns ett värde i att se till att patienten erhåller nödvändiga vaccin vid besöket, då det alltid finns en risk att de inte kommer tillbaka för den andra sprutan.

Individuell bedömning vid kombination av vaccin

Samtidig administration av flera vaccin kan ge ökade främst lokala biverkningar, men även risk för ökad feberreaktion. De individuella konsekvenserna av ev. ökade biverkningar för den vaccinerade behöver beaktas när två eller fler vaccin ges samtidigt. Det är särskilt viktigt vid vaccination av äldre, medicinskt sköra personer och vid vaccination av gravida.

Vid tveksamheter om sjukdomskaraktär och lämpligheten att vaccinera ska patientansvarig eller annan sakkunnig läkare rådfrågas.

- Det förstärkta influensavaccinet kan ges samtidigt som konjugerat pneumokockvaccin. För att minska risken för biverkningar kan de istället ges med en veckas mellanrum. Risk finns dock att vaccinationen inte blir av överhuvudtaget om man sprider ut doserna då invånaren inte återkommer.
- Om ett levande vaccin ges ska man vänta 4 veckor innan ett annat levande vaccin ges ex. gula febern, vattkoppsvaccin mfl

	Fluarix	Fluad	Fluenz Tetra	Pneumovax (PPV23)	Prevenar 13	Prevenar 20	Comirnaty JN.1	TBE	Hepatit	Shingrix	HPV-vaccin
Fluarix											
Fluad											
Fluenz Tetra											
Pneumovax (PPV23)											
Prevenar 13											
Prevenar 20											
Comirnaty JN.1											
TBE											
Hepatit											
Shingrix											
HPV-vaccin											

- Kombination av vaccin vid samma tillfälle: Grönt = OK, Rött = Nej
- Ges fler vaccin går det bra att ge flera sprutor i samma arm, men om det är bara är två vaccin ges de i två olika extremiteter. Om man ger i samma arm ska man separera sticken med 3 cm.