

# Workshop vinterkräksjuka

Besvara nedanstående påståenden enskilt och diskutera sedan svaren i grupp.

|   | Sant | Falskt |
|---|------|--------|
| Caliciutbrott uppträder bara under vinterhalvåret   |      |        |
| Inkubationstiden för calici är cirka en vecka   |      |        |
| Smitt dosen för calici är bara ett tiotal viruspartiklar  |      |        |
| Calicivirus finns i avföring och kräkningar   |      |        |
| Vid misstänkt calici vid en avdelning behövs förstärkta hygienrutiner                                     |      |        |
| Avdelningen ska invänta provsvar innan åtgärder vidtas  |      |        |
| De flesta typer av handdesinfektion har tillräcklig effekt på calicivirus                                 |      |        |
| Personal som insjuknar med kräkningar och diarré på arbetsplatsen ska informera sin chef och sedan gå hem |      |        |
| Calicivirus kan överleva länge i miljön   |      |        |
| Personal som varit magsjuk ska inte återgå i tjänst förrän 48 timmar efter sista symtom                   |      |        |
| Ett caliciutbrott innebär att minst tio patienter/brukare och/eller personal ha insjuknat                 |      |        |
| Slutrapport skickas endast om utbrottet varit större än förväntat   |      |        |
| Slutrapporten fylls i elektroniskt på Vårdhygiens hemsida   |      |        |

Vårdhandboken [Virusorsakad gastroenterit, inklusive vinterkräksjuka](#)