

MALL FÖR CASED BASED DISCUSSION (CBD) FÖR BT/ST-LÄKARE

Fallbaserad diskussion (CBD) fokuserar på att diskutera patientfall i syfte att ge den handledda återkoppling på hur denne för kliniska och etiska resonemang i relation till de beslut som fattats kring patienten. Besluten kan gälla bedömning, undersökning, behandling, remittering och uppföljning. Den fallbaserade diskussionen ger även möjlighet att ge återkoppling på journalföring

BT/ST-läkare: _____

Bedömare: _____ Datum: _____

Klinisk svårighet/komplexitet: ☐ Enkelt ☐ Medel ☐ Svårt

Kort beskrivning av fallets frågeställning: _____

Fokus för diskussionen:

☐ Journalföring ☐ Kliniks bedömning ☐ Behandling bedömning ☐ Professionalism/Etik

Stöd för kompetensbedömning av självständighetsnivå:

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5
BT/ST-läkaren behöver hjälp med alla moment i handläggning	BT/ST-läkaren klarar de flesta moment själv med proaktiv handledning	BT/ST-läkaren klarar nästan alla moment själv med reaktiv handledning	BT/ST-läkaren klarar alla moment självständigt	BT/ST-läkaren uppvisar den grad av kompetens i handläggningen att den själv skulle kunna handla i liknande fall
Exempel: Fall som är helt nya för läkaren Exempel: Fall som läkaren borde kunna handlägga men ändå inte kan utföra självständigt, inte ens med stöd	<i>Proaktiv handledning</i> Handledaren behöver närvara i handläggning för att det skall bli rätt handlagt	<i>Reaktiv handledning</i> När bedömarens uppfattar att handläggningen utförs tillfredställande men vill korrigera något för förbättring	Exempel: Inget behöver tilläggas eller justeras för en korrekt handläggning. Betyder inte att alla skulle gjort på precis samma sätt alltid.	

Bedömning efter diskussion (Se nivåbeskrivning på föregående sida):

Självständighetsnivå Journalföring: <i>till exempel – förmåga till struktur, omfattning/avgränsning, sammanfattning, planering</i>
Självständighetsnivå på adekvata kliniska slutsatser: <i>till exempel – förmåga till relevant differential diagnostiskt tänk, resonemang kring fynd och icke fynd</i>
Självständighetsnivå avseende behandling: <i>förmåga att välja relevant evidensbaserad behandling utifrån patientens behov och situation</i>
Självständighetsnivå gällande förslag på vidare utredning/remittering samt uppföljning <i>förmåga att avgränsa och dra adekvata slutsatser samt att motivera diagnos och åtgärdsplan</i>
Självständighetsnivå i resonemang utifrån ett professionellt/etiskt förhållningssätt <i>förmåga till resonemang kring prognos, kostnadseffektivitet, rättvisepprinciper och etiska överväganden</i>